

## TANTOGRIP® citrón

600 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku  
paracetamol, phenylephrini hydrochloridum

### Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

### Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek TANTOGRIP® a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTOGRIP® užívat
3. Jak se přípravek TANTOGRIP® užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek TANTOGRIP® uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### 1. Co je přípravek TANTOGRIP® a k čemu se používá

Přípravek TANTOGRIP® obsahuje kombinaci léčivých látek účinných při úlevě od příznaků spojených s nachlazením a chřipkou včetně úlevy od různých bolestí, bolesti v krku a bolesti hlavy, zduření nosní sliznice a snížení zvýšené tělesné teploty.

Paracetamol je dobře známý lék proti bolesti (analgetikum). Je účinný proti bolestem včetně bolesti hlavy a také snižuje horečku (antipyretikum).

Fenylefrin hydrochlorid (látko snižující zduření nosní sliznice) zmírňuje otok v nose, čímž uvolňuje ucpaný nos a snižuje tak tlak v nose, který může vyvolat bolest hlavy.

Přípravek TANTOGRIP® je určen k podávání dospělým a dospívajícím od 12 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

#### 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTOGRIP® užívat

Tak jako ostatní léčivé přípravky i přípravek TANTOGRIP® nemusí být vhodný pro každého.

#### Neužívejte přípravek TANTOGRIP®:

- jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže máte závažné srdeční obtíže,
- jestliže máte vysoký krevní tlak (hypertenzi) nebo zvýšenou činnost štítné žlázy,
- jestliže užíváte nebo jste v posledních 14 dnech užíval(a) léčivo zvané inhibitor monoaminooxidázy (MAO), které se obvykle užívá k léčbě depresí,
- jestliže užíváte jiné přípravky určené k odstranění zduření nosní nebo oční sliznice (sympatomimetika).

#### Upozornění a opatření

Neužívejte tento léčivý přípravek s jinými přípravky obsahujícími paracetamol, užití více než 6-8 g paracetamolu za den může poškodit Vaše játra. I když nemáte potíže s játry, může se poškození jater objevit i při nižších dávkách nebo při krátkodobém užívání, pokud požíváte alkohol nebo jiné léčivé přípravky, které mohou být pro játra toxické. Dlouhodobé nadměrné požívání alkoholu výrazně zvyšuje riziko toxicity paracetamolu pro játra. Nejvyšší riziko je u chronických alko-

holiků, kteří krátce abstínují (12 hodin). Během užívání tohoto léčivého přípravku nepožívejte alkohol.

Před užitím přípravku TANTOGRIP® se poradte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- Jestliže máte Raynaudův syndrom (nedostatečný krevní oběh způsobující bledost a necitlivost prstů na rukou a na nohou) nebo cukrovku.
- Jestliže máte potíže s játry nebo ledvinami.
- Jestliže máte ne-cirhotické onemocnění jater (onemocnění jater, které není spojeno se změnami jaterní struktury).
- Jestliže máte glaukom s uzavřeným úhlem nebo zvětšenou prostatu.

#### Další léčivé přípravky a přípravek TANTOGRIP®

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je obzvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících přípravků:

- Přípravky, které mohou zrychlit vstřebávání paracetamolu (např. metoklopramid a domperidon užívané proti nevolnosti a zvracení) nebo ho zpomalit/zpozdít (např. cholestyramin užívaný k úpravě hladin cholesterolu v krvi).
- Přípravky užívané k ředění krve nebo k prevenci srážení krve (např. warfarin a jiné kumariny), protože užívání vysokých dávek paracetamolu může zvýšit riziko krvácení.
- Přípravky obsahující tricyklická antidepresiva (zvláštní skupina léků k léčbě deprese), jiné přípravky uvolňující zduření nosní sliznice nebo barbituráty (užívané na problémy se spaním nebo k léčbě epilepsie).
- Přípravky obsahující inhibitory monoaminooxidázy (viz také bod „Neužívejte přípravek TANTOGRIP®“).
- Přípravky obsahující betablokátory (léky užívané k úpravě vysokého krevního tlaku) nebo vazodilatátory (léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a bolestí nohou v důsledku potíží s cévami nebo k léčbě Raynaudova syndromu).
- Přípravky proti selhání srdce (digoxin a srdeční glykosidy).

#### Těhotenství a kojení

Užívání přípravku TANTOGRIP® v těhotenství nebo během kojení se nedoporučuje.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

#### Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebylo prokázáno, že by přípravek TANTOGRIP® ovlivňoval schopnost řídit či obsluhovat stroje.

#### Přípravek TANTOGRIP® obsahuje sacharózu, sodík a glukózu.

Sacharóza: Přípravek obsahuje 1,8 g sacharózy v jednom sáčku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poradte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou při užití více než 2 sáčků za den (více než 5 g sacharózy).

Sodík: Tento přípravek obsahuje 112,9 mg sodíku v jednom sáčku. Nutno vzít v úvahu u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Glukóza: Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poradte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

### 3. Jak se přípravek TANTOGRIP® užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

#### Dávkování

*Dospělí a dospívající od 12 let*

1 sáček po 4–6 hodinách, maximálně 4 sáčky během 24 hodin.

#### *Použití u dětí*

Přípravek není určen k podávání dětem do 12 let.

#### Návod k použití

Obsah sáčku rozpustíte ve sklenici (přibližně 150 ml) horké nebo studené vody a přisladíte podle chuti.

Jestliže příznaky nachlazení nebo chřipky přetrvávají více než 3 dny, nebo se zhorší, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Neužívejte přípravek TANTOGRIP® déle než 5 dnů.

#### Jestliže jste užil(a) více přípravku TANTOGRIP®, než jste měl(a)

Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) příliš velkou dávku přípravku TANTOGRIP®, nebo pokud se domníváte, že dítě požílo přípravek ze sáčku, kontaktujte ihned nejbližší nemocniční pohotovost nebo svého lékaře.

Nemocnici nebo svého lékaře kontaktujte, i když se cítíte dobře, protože hrozí riziko opožděného závažného poškození jater. S sebou vezměte tuto příbalovou informaci, zbylé sáčky a krabičku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

### 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

- Kožní reakce

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

- Alergická nebo hypersenzitivní reakce (jako je vyrážka na kůži)
- Poruchy krve jako je trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček, které může vést k náchylnosti ke krvácení nebo tvorbě modřin), pancytopenie (snížení počtu červených a bílých krvinek), agranulocytóza, leukopenie nebo neutropenie (snížení počtu bílých krvinek vedoucí k větší náchylnosti k infekcím)
- Vysoký krevní tlak
- Bolest hlavy
- Zvracení
- Palpitace (nepravidelný tep nebo silný tlukot srdce)
- Akutní zánět slinivky břišní (zánět slinivky typický přítomností náhlé bolesti břicha)
- Potíže s močením (pouze u mužů)

#### Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

### 5. Jak přípravek TANTOGRIP® uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Je důležité, abyste vždy měli k dispozici údaje o přípravku. Ponechte si krabičku i příbalovou informaci.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

### 6. Obsah balení a další informace

**Co přípravek TANTOGRIP® obsahuje**  
Jeden sáček obsahuje:

Léčivými látkami jsou: paracetamol 600 mg a phenylephrin hydrochlorid 10 mg (což odpovídá phenylephrinu 8,2 mg).

Dalšími složkami jsou sacharosa, bezvodá kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, kyselina askorbová, koloidní bezvodý oxid křemičitý, citronové aroma, práškový kurkumin 5% (kurkumin E 100 + tekutá glukosa usušená rozprášením). Viz také bod 2 „Přípravek TANTOGRIP® obsahuje sacharosu, sodík a glukosu“.

#### Jak přípravek TANTOGRIP® vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek TANTOGRIP® je prášek pro perorální roztok v sáčku. Přípravek TANTOGRIP® je dostupný v baleních po 10 nebo 16 sáčcích. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

#### Držitel rozhodnutí o registraci:

Angelini Pharma Česká republika s.r.o. Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, Česká republika

#### Výrobce:

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona, Itálie

#### Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Velká Británie:  
TANTUMGRIP lemon flavour  
600 mg/10 mg powder for oral solution

Rakousko:  
TACHIFLUDEC mit Zitronengeschmack,  
600 mg/10 mg Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Bulharsko:  
Тантум Флу с вкус на лимон  
600 mg/10mg прах за перорален разтвор в саше

Česká republika:  
TANTOGRIP® citrón

Maďarsko:  
TANTOGRIP citrom 600mg/10mg por belsőleges oldathoz

Řecko:  
TANTOGRIP 600mg/10mg κόκκις για πόσιμο διάλυμα με γεύση λεμόνι σε φακελάσκο

Polsko:  
TANTUM FLU o smaku cytrynowym

Portugalsko:  
TANTUMGRIP sabor a limão  
600 mg+10 mg pó para solução oral

Rumunsko:  
TANTUMGRIP cu gust de lămâie,  
600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală

Slovenská republika:  
TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prášok na perorálny roztok s citrónovou príchuťou

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 9. 2017.**